






صحيفة نصائح تتعلق بما يحدث بعد التطعيم

ضد كوفيد "COVID"

رد الفعل/الأعراض بعد التطعيم	ما مدى شيوع هذا العرض؟	ما يجب القيام به
رد فعل موقع الحقن الموضعي فقط (على سبيل المثال، الاحمرار أو التورم في موقع الحقن)	 الأعراض الشائعة جدًا	ضع كمادة باردة على موقع الحقن. قد تتناول أسيتامينوفين أو إيبوبروفين للألم.
رد الفعل البسيط بعد التطعيم، يتضمن ما يلي: • الشعور بالحمي ولكن درجة الحرارة أقل من 100.4 فهرنهايت • صداع خفيف • تعب مستجد (شعور مستجد بالتعب) • ألم خفيف بالعضلات (آلام العضلات) • ألم خفيف في المفاصل (آلام في المفاصل)	 الأعراض الشائعة جدًا	قد تتناول أسيتامينوفين أو إيبوبروفين للألم وبسبب الشعور بالحمي.
أعراض تحسسية خفيفة (الحكة والطفح الجلدي ليس الشرى) تحدث بعد مغادرة الموقع	 الأعراض النادرة	ضع كمادة باردة على موقع الحقن. قد تتناول الدواء المضاد للحكة (مضاد الحكة)، مثل كلاريتين أو زيرتك أو بينادريل.
أعراض خفيفة أو حادة، تتضمن ما يلي: • حمى تصل درجة حرارتها إلى 100.4 فهرنهايت أو أكثر • صداع خفيف/حاد [أو] • تعب يتراوح بين خفيف إلى حاد (شعور بالتعب) [أو] • ألم بالعضلات خفيف/حاد [أو] • ألم بالمفاصل خفيف/حاد [أو]	 الأعراض النادرة	تناول أسيتامينوفين أو إيبوبروفين للألم أو الحمى وتواصل مع مكتب مقدم الرعاية الأولية للحصول على مزيد من النصائح.
ردود فعل تحسسية أكثر حدة بما في ذلك الشرى، الشفاه أو اللسان أو العينين أو الوجه المنتفخ أو التنفس بصفير أو ضيق الصدر أو ضيق التنفس	 الأعراض النادرة جدًا	إذا تطورت صعوبة التنفس لديك، أو تورم الفم أو الحلق، أو التنفس بصفير، فاتصل بالرقم 911 أو توجه إلى أقرب غرفة للطوارئ فورًا