

Информация о реакциях/симптомах после вакцинации от COVID



Реакции/симптомы после вакцинации		Как часто встречается этот симптом?	Что делать
Локальная реакция только в месте инъекции (например, покраснение или опухоль в месте инъекции)		Очень часто	Приложить холодный компресс к месту инъекции. Можно принять ацетаминофен или ибупрофен для обезболивания.
Легкая реакция на вакцинацию, включая следующие симптомы: <ul style="list-style-type: none"> • небольшой жар, но температура ниже 38,0 °C (100,4 °F); • небольшая головная боль; • ранее не проявлявшаяся утомляемость (чувство усталости, которого раньше не было); • легкая миалгия (боль в мышцах); • легкая артралгия (боль в суставах) 		Очень часто	Можно принять ацетаминофен или ибупрофен для обезболивания и снятия температуры.
Легкие аллергические симптомы (зуд, сыпь, но НЕ крапивница), возникающие после ухода из медицинского учреждения		Редко	Приложить холодный компресс к месту инъекции. Можно принять противозудное средство, например Кларитин, Зиртек или Бенадрил.
Умеренные или тяжелые симптомы, включая следующие: <ul style="list-style-type: none"> • температура 38,0 °C (100,4 °F) или выше; • умеренная/сильная головная боль; или • умеренная или сильная утомляемость (чувство усталости); или • умеренная/сильная миалгия; или • умеренная/сильная артралгия 		Редко	Примите ацетаминофен или ибупрофен для обезболивания или снижения температуры и позвоните своему поставщику первичных медицинских услуг для получения консультации.
Более сильные аллергические реакции, включая крапивницу, отек губ, языка, глаз или лица, хрипы, сдавленность в груди или одышка		Очень редко	Если у вас появятся затрудненное дыхание, отек рта или горла, хрипы, немедленно звоните 911 или направляйтесь в ближайшее отделение неотложной медицинской помощи.