






Hoja de orientación para después de recibir la vacuna contra la COVID



| Reacciones o síntomas posteriores a la vacunación | | ¿Qué tan frecuente es este síntoma? | ¿Qué hacer? |
|---|--|-------------------------------------|---|
| <p>Reacción local únicamente en el lugar de la inyección (es decir, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección).</p> |  | <p>Muy frecuente</p> | <p>Aplicar compresas frías en el lugar de la inyección. Puede tomar paracetamol o ibuprofeno para el dolor.</p> |
| <p>Reacción leve después de la vacunación, que incluye los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> •sensación de fiebre, pero con una temperatura inferior a 100.4 °F; •dolor de cabeza leve; •fatiga reciente (sensación reciente de sentirse cansado); •mialgias leves (dolores musculares); •artralgias leves (dolor en las articulaciones). |  | <p>Muy frecuente</p> | <p>Puede tomar paracetamol o ibuprofeno para el dolor y la sensación de fiebre.</p> |
| <p>Síntomas alérgicos leves (picazón, sarpullido, pero NO urticaria) que se producen después del periodo de observación.</p> |  | <p>Poco frecuente</p> | <p>Aplicar compresas frías en el lugar de la inyección. Puede tomar medicamentos antipruriginosos (contra la picazón), como Claritin, Zyrtec o Benadryl.</p> |
| <p>Síntomas moderados o graves, que incluyen los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fiebre de 100.4 °F o más; • dolor de cabeza moderado o grave; • fatiga de moderada a grave (sensación de sentirse cansado); • mialgias moderadas o graves; • artralgias moderadas o graves. |  | <p>Poco frecuente</p> | <p>Tome paracetamol o ibuprofeno para el dolor o la fiebre y llame al consultorio de su proveedor de atención primaria para recibir asesoramiento.</p> |
| <p>Reacciones alérgicas más graves. Por ejemplo, urticaria; hinchazón de labios, lengua, ojos o cara; sibilancias; opresión en el pecho o dificultad para respirar.</p> |  | <p>Muy poco frecuente</p> | <p>Si tiene problemas para respirar, hinchazón en la boca o la garganta, o sibilancias, llame al 911 o diríjase a la sala de emergencias (ER) más cercana de inmediato.</p> |